

L'oral commencera par des questions de cours issues de la la liste des **questions de cours** associée à ce programme.

Cette partie sera évaluée sur environ 4 points. La réponse doit être rapide et précise! (Pas plus de 20 minutes).

Ces questions de cours peuvent être : l'énoncé d'un théorème ou d'une définition, un bilan des connaissances sur un thème précis, une mise en application directe d'un point ou d'une méthode du cours.

• **Cours** :

CHAPITRE XI ISOMÉTRIES D'UN ESPACE EUCLIDIEN

I) Isométries vectorielles

I-1) Définition et caractérisation I-2) Groupe orthogonal I-3) Exemple de référence : les symétries orthogonales

Les élèves doivent :

- connaître la définition d'une isométrie (endomorphisme qui conserve la norme)
- connaître la caractérisation d'une isométrie par le produit scalaire (application de E dans E qui conserve le produit scalaire) ou par l'image des bases orthonormées (endomorphisme pour lequel l'image d'une BON est une BON)
- connaître le groupe orthogonal $O(E)$ et savoir qu'il est inclus dans $GL(E)$, qu'il est stable par composition et par passage à l'inverse.
- savoir qu'une isométrie qui laisse stable un sev F laisse également $F^\perp$ stable.
- définir une symétrie orthogonale (en particulier une réflexion) et savoir que c'est une isométrie.

II) Matrices orthogonales

II-1) Matrice d'un endomorphisme dans une BON, matrice de passage dans une BON

II-2) Matrice orthogonale II-3) Matrices orthogonales et isométries

Les élèves doivent :

- pouvoir exploiter les propriétés de calcul dans la BON $\mathcal{B}$ de E pour déterminer la matrice $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u)$ si $u \in \mathcal{L}(E)$
- savoir qu'une matrice de passage P entre deux BON vérifie $P^T P = I_n$
- savoir définir une matrice orthogonale ($M \in M_n(\mathbb{R})$ et $M^T M = I_n = M M^T$) et connaître la définition du groupe orthogonal et la notation $O_n(\mathbb{R})$ (ou $O(n)$)
- savoir caractériser les matrices orthogonales par l'une des relations équivalentes
 $M^T M = I_n \Leftrightarrow M M^T = I_n \Leftrightarrow$ les colonnes (resp. les lignes) de la matrice forme un BON de $\mathbb{R}^n$ euclidien usuel
- savoir qu'une matrice orthogonale est une matrice de passage entre deux bases BON
- savoir que, dans une BON, la matrice d'une isométrie est orthogonale et savoir identifier une symétrie orthogonale lorsqu'elle est donnée par sa matrice dans une BON ($A \in O_n(\mathbb{R})$ et $A^2 = I_n$)
- connaître la définition du groupe spécial orthogonal, la notion d'isométrie directe, d'isométrie indirecte et les notations $SO_n(\mathbb{R})$ (ou $SO(n)$) et $SO(E)$ et savoir que $SO_n(\mathbb{R})$ est stable par le produit matriciel et le passage à l'inverse.
Attention! Terminologie directe/indirecte et plus positive/négative
- connaître les résultats sur le déterminant des matrices orthogonales/des isométries
- savoir que les valeurs propres d'une isométrie/matrice orthogonale sont de module 1

III) Isométries de l'espace euclidien de dimension 2 ou 3

III-1) Orientation d'un espace euclidien

Les élèves doivent :

- savoir qu'on oriente un espace euclidien en choisissant une base orthonormée $\mathcal{B}_0$ de référence : une autre base orthonormée $\mathcal{B}$ est directe lorsque $P = P_{\mathcal{B}_0, \mathcal{B}} \in SO_n(\mathbb{R})$ et indirecte lorsque $P = P_{\mathcal{B}_0, \mathcal{B}} \in O_n(\mathbb{R}) - SO_n(\mathbb{R})$
- connaître les conventions d'orientation dans le plan et l'espace usuel
- être capables, pour $n = 2$ ou $n = 3$, de savoir si une matrice $M \in M_n(\mathbb{R})$ est dans $O_n(\mathbb{R})$ voir $SO_n(\mathbb{R})$ en montrant que les colonnes forment une base orthonormée voir une base orthonormée directe en utilisant le produit scalaire et, dans $\mathbb{R}^3$, le produit vectoriel.

III-2) Description des isométries vectorielles planes

Les élèves doivent :

- savoir que les isométries planes sont soit des rotations (pour les directes) soit des réflexions (pour les indirectes)
- connaître la forme d'une matrice orthogonale d'ordre 2 :

$$\begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} = R(\theta) \in SO_2(\mathbb{R}) \quad \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ \sin \theta & -\cos \theta \end{pmatrix} = S(\theta) \in O_2(\mathbb{R}) - SO_2(\mathbb{R})$$

- connaissant la matrice d'une isométrie plane, pouvoir l'identifier géométriquement (retournement, rotation, réflexion)'
- connaissant la nature géométrique d'une isométrie, pouvoir donner sa matrice dans une base quelconque (orthonormée ou pas)

II-3) Description des isométries vectorielles de $\mathbb{R}^3$

Les élèves doivent :

- reconnaître une isométrie de l'espace à l'aide de sa matrice dans une base orthonormée
- identifier les matrices de $O_3(\mathbb{R})$ ou de $SO_3(\mathbb{R})$ (en particulier en raisonnant en terme de base orthonormée (éventuellement directe) de ses colonnes)
- savoir définir les notions de rotation plane d'angle θ d'axe $D = \text{Vect}(u)$ dans $\mathbb{R}^3$ et la notion de réflexion par rapport au plan P
- savoir que les isométries de l'espace non triviale (càd différente de $\pm id$) sont soit des rotations soit des composées de rotation/réflexion
- savoir déterminer une BON dans laquelle une rotation de $\mathbb{R}^3$ a pour matrice $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$ ou $\begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$
- savoir déterminer une BON dans laquelle une isométrie indirecte de $\mathbb{R}^3$ a pour matrice $\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$ ou $\begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$
- savoir identifier les caractéristiques géométriques d'une isométrie de l'espace
- savoir utiliser la formule de changement de bases dans le cas de bases orthonormées pour donner la matrice d'une isométrie caractérisé géométriquement dans la base canonique

Attention! L'étude d'une isométrie directe ou d'une réflexion de $\mathbb{R}^3$ peut être donnée sans indication mais l'étude des isométries indirectes (en toute généralité) n'est pas un objectif du programme

On pourra consulter [le point méthodologique](#) et [TD n° 1 du chapitre XI](#)

IV) Matrice symétrique réelle

Les élèves doivent :

- connaître la définition d'une matrice symétrique réelle d'ordre n , de $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ et savoir que $\dim \mathcal{S}_n(\mathbb{K}) = \frac{n(n+1)}{2}$
- savoir que les sev propres d'une matrice symétrique réelle sont 2 à 2 orthogonaux
- connaître le résultat de réduction des matrices symétriques réelles : une matrice symétrique réelle est diagonalisable avec une matrice de passage orthogonale soit : $\forall A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R}), \exists P \in O_n(\mathbb{R}), P^T A P = D$ est diagonale et réelle.
Autrement dit : A est diagonalisable dans $M_n(\mathbb{R})$ dans une base orthonormée de vecteurs propres
- savoir concrètement réduire une matrice symétrique réelle (d'ordre 2 ou 3) dans une base orthonormée de vecteurs propres pour avoir une matrice de passage orthogonale
- savoir que le résultat est faux si la matrice est symétrique mais à coefficients complexes (non réels)

On pourra consulter [le point méthodologique](#) et [TD n° 2 du chapitre XI](#)

Suite page suivante

Ce chapitre a été étudié en classe inversée

I) Probabilité sur un ensemble fini (Rappels PTSI)

Les élèves doivent

- connaître le vocabulaire usuel des probabilités sur un univers finis (univers, événement, événement élémentaire)
- savoir définir une probabilité sur un univers finis ($P(\Omega) = 1$ et probabilité d'une union d'événements incompatibles) définie éventuellement en donnant les probabilités des événements élémentaires
- connaître ses propriétés (passage au complémentaire, probabilité d'une réunion, croissance de la probabilité)
- reconnaître une situation d'équiprobabilité
- définir l'indépendance de 2 événements (à ne pas confondre avec des événements incompatibles) et l'indépendance mutuelle d'une famille finie d'événements (à ne pas confondre avec l'indépendance 2 à 2 des événements)
- définir une probabilité conditionnelle et utiliser la formule des probabilités composées
- définir et introduire judicieusement un système complet d'événements de probabilités non nulles pour utiliser la formule des probabilités totales
- utiliser la formule de Bayes

II) Espaces probabilisés

II-1) Ensemble dénombrable

Les élèves doivent connaître la définition et savoir que $\mathbb{N}, \mathbb{N}^*$, toute partie de $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$ et $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ sont dénombrables et qu'un produit cartésien d'ensemble dénombrable est dénombrable.

Les résultats suivants ont été admis : $\mathbb{Q}$ est dénombrable, $\mathbb{R}$ et $[0, 1]$ ne sont pas dénombrables.

II-2) Espaces probabilisés

Les élèves doivent

- connaître la définition d'une tribu sur un univers quelconque (contient l'univers, stable par passage au complémentaire et par union dénombrable) et en connaître les propriétés classiques (contient le vide, stabilité pour intersection dénombrable)
- pouvoir relier le vocabulaires probabilistes et ensemblistes. En particulier :
 - une union dénombrable $\bigcup_{n=0}^{+\infty} A_n$ signifie qu'au moins l'un des A_n est réalisé soit $x \in \bigcup_{n=0}^{+\infty} A_n \Leftrightarrow \exists n \in \mathbb{N}, x \in A_n$
 - une intersection dénombrable $\bigcap_{n=0}^{+\infty} A_n$ signifie que tous les A_n sont réalisés soit $x \in \bigcap_{n=0}^{+\infty} A_n \Leftrightarrow \forall n \in \mathbb{N}, x \in A_n$
- connaître la définition d'une probabilité sur un univers Ω munit d'une tribu $\mathcal{A}$ ($P(\Omega) = 1$ et propriété de σ -additivité) et connaître les propriétés classiques (idem univers fini avec, en plus, continuité croissante et décroissante et sous-additivité)
- définir les événements certains, impossible, presque sûr et négligeable

II-3) Indépendance

Les élèves doivent savoir qu'on généralise les définitions vu sur les univers finis. Le programme n'envisage que des familles finies d'événements mutuellement indépendants.

II-4) Conditionnement

Les élèves doivent

- savoir qu'on généralise la définition de probabilité conditionnelle et la formule des probabilités composées vu sur les univers finis
- pouvoir définir un système $(A_i)_{i \in I}$ complet ou quasi-complets d'événements (où I est un ensemble fini ou $I = \mathbb{N}$)
- connaître la généralisation de la formule des probabilités totales et de la formule de Bayes.

On pourra consulter [TD n° 1 du chapitre XII](#) et [TD n° 2 du chapitre XII](#)

Suite page suivante

Les élèves doivent différentier une intégrale à paramètre $F(x) = \int_J f(x, t) dt$ d'une intégrale dépendant de ces bornes qu'on étudie en introduisant judicieusement une primitive (Exemples : $F(x) = \int_0^{x^2} e^{-t^2} dt$ ou $G(x) = \int_x^{+\infty} \frac{e^{-t}}{t} dt$).

I) Définition

Les élèves doivent pouvoir donner le domaine de définition d'une intégrale à paramètre si celui-ci s'obtient en utilisant les résultats usuels sur les intégrales convergentes (prolongement continue, critère d'équivalence, théorème de comparaison ou de domination, IPP, changement de variables)

II) Continuité

Les élèves doivent pouvoir étudier la continuité suivant le paramètre d'une intégrale à paramètre en utilisant le théorème du programme. L'hypothèse de domination peut être obtenue localement (par exemple sur tout segment) mais, conformément au programme, le sujet devra alors comporter une indication. **Le programme ne propose plus de corollaire lorsque l'intervalle J d'intégration est un segment.**

III) Dérivation

Les élèves doivent pouvoir étudier la dérivabilité suivant le paramètre et préciser la dérivée d'une intégrale à paramètre en utilisant le théorème du programme. L'hypothèse de domination peut être obtenue localement (par exemple sur tout segment) mais, conformément au programme, le sujet devra alors comporter une indication. **Le programme ne propose plus de corollaire lorsque l'intervalle J d'intégration est un segment.**

Exemples du situation utilisant la continuité ou la dérivabilité d'une intégrale à paramètre :

- calcul d'une limite en utilisant la continuité
- calcul d'une limite en utilisant la dérivabilité (taux d'accroissement)
- calcul explicite de l'expression d'une intégrale à paramètre à l'aide d'une recherche de primitive ou d'un problème de Cauchy

IV) Classe C^n où $n \in \mathbb{N} \cup \{+\infty\}$

Il n'y a pas de théorème directement au programme mais il suffit, en général, de mener un raisonnement par récurrence où on applique le théorème de dérivation pour prouver l'hérédité. L'exemple n°5, illustrant ce principe, a été traité.

On pourra consulter TD n° 1 du chapitre XIII et TD n° 2 du chapitre XIII

• Exercices :

- Pour le chapitre XI, les exemples 1, 2 et 3 et les exercices 1 et 2 auront été traité
- Pour le chapitre XII, tous les exercices auront été traité.
- Pour le chapitre XIII, tous les exemples et exercices auront été traités.

FIN